

NEU

Simparica[®]
(Sarolaner) Kautabletten

1x IM MONAT =
5 WOCHEN SCHUTZ



NEU
von
zoetis





Simparica[®]

(Sarolaner) Kautabletten

**Die vorteilhafte Kautablette für einen breiten Schutz
gegen Ektoparasiten bei Hunden**

 ***I. ricinus***
 ***I. hexagonus***
 ***D. reticulatus***
 ***R. sanguineus***



 ***C. felis***
 ***C. canis***




 ***Sarcoptes
scabiei* var.
*canis***





Sarolaner – der neue Wirkstoff

GABA-Rezeptor von Floh, Zecke und Milbe



Sarolaner wirkt über den GABA-Rezeptor auf das ZNS der Ektoparasiten:

- Blockiert den Chlorid-Ionen-Durchfluss am GABA-Rezeptor
- Führt zu erhöhter Nervenstimulation und Hyperexzitation beim Parasiten
- Erzielt damit ein rasches Absterben der Parasiten

Sarolaner – der neue Wirkstoff



Niedrige Wirkstoff-Dosis pro Kautablette

Gute Verträglichkeit

In klinischen Studien traten in der empfohlenen Dosierung keine durch Simparica® verursachten Nebenwirkungen auf. Bei 1.600 Hunden:

- Kein Erbrechen oder Durchfall
- Keine Appetitlosigkeit
- Kein vermehrter Speichelfluss
- Kein Juckreiz
- Keine Lethargie oder Anorexie




Zugelassen
für Hunde
ab **1,3 kg**



Verlässlicher Zecken-Schutz

Wirksamkeit von Simparica® gegen *I. ricinus**



- Konstante Wirkung gegen *I. ricinus* über 35 Tage*
- Wirkte gegen *I. ricinus*, *I. hexagonus*, *D. reticulatus*, *R. sanguineus***
- Keine Sicherheitslücke über den vollen Monat*


* Zoetis-Studien (2013): A166C-IE-13-159, A166C-DE-13-154

** Zoetis-Studie (2012): A161C-XC-12-082

Verlässlicher Zecken-Schutz



Geschwindigkeit der Zeckenabtötung (*Ixodes ricinus*)*




- Simparica® tötet Zecken (*Ixodes ricinus*) innerhalb von 12 Std. nach Ansaugen.
- Vor Tabletteneingabe angesaugte Zecken werden innerhalb von 24 Std. abgetötet.



Verlässlicher Floh-Schutz*

Wirksamkeit von Simparica® gegen *C. felis**



- Schnelle Wirkung ab dem 1. Tag**
- 8 Std. nach Gabe starben 100 % der Flöhe ab.**
- Konstante Wirkung über mindestens 35 Tage*


* Zoetis-Studie (2012): A161C-XC-12-151

** Zoetis-Studien (2012): A166C-US-12-113, A162C-IE-12-027

Verlässlicher **Schutz vor Floheiern***



Wirkung gegen Floheier: Simparica® vs. Placebo



- Während des Untersuchungszeitraums wurden keine Floheier in der Umgebung der behandelten Hunde nachgewiesen.*
- Signifikant bessere Wirkung als Placebo**
- Präventiv gegen Floheier im häuslichen Umfeld

* Zoetis-Studie (2013): A166C-US-13-268, EPAR S. 20

** (p < 0.0001)



Simparica® gegen **Milben**

Fachinformationen im Vergleich

Milbenart	Simparica® ¹	Kautablette 1 ²	Kautablette 2 ³
<i>Sarcoptes scabiei</i> var. <i>canis</i>	Zulassung*	keine Zulassung	keine Zulassung
<i>Demodex canis</i>	keine Zulassung**	keine Zulassung	keine Zulassung
<i>Otodectes cynotis</i>	keine Zulassung***	keine Zulassung	keine Zulassung

Simparica®, die einzige zugelassene Kautablette gegen *S. scabiei* var. *canis*



* Zoetis-Studie (2012): A166C-ZA-12-010 (Simparica® Fachinformation 4.2.)

** Zoetis-Studie (2012): A166C-ZA-12-012 (Simparica® Fachinformation 5.1.)


*** Zoetis-Studie (2012): A166C-ZA-12-011 (Simparica® Fachinformation 5.1.)

¹ Fachinformation Simparica®, EMA, Stand: 15.09.2015.


² Fachinformation NexGard®, EMA, Stand: 16.06.2015.

³ Fachinformation Bravecto®, EMA, Stand: 30.09.2015.

Verlässlicher **Milben-Schutz***



Wirksamkeit von Simparica® bei *S. scabiei* var. *canis**



- Sehr gute Milbenabtötung über 60 Tage*
- Signifikant wirksamer als Placebo*
- Durchgehend hohe Wirksamkeit über 60 Tage*



Individuelle **Dosierung**

**1 x im
Monat**

Dosierung: 2–4 mg Wirkstoff pro kg Körpergewicht

Körpergewicht	Wirkstoff (mg Sarolaner)	Tablettenmenge
1,3–2,5 kg	5 mg	1 Tablette
> 2,5–5 kg	10 mg	1 Tablette
> 5–10 kg	20 mg	1 Tablette
> 10–20 kg	40 mg	1 Tablette
> 20–40 kg	80 mg	1 Tablette

- Lecker schmeckende Kautablette*
- Gabe mit oder ohne Futter möglich
- Ab 8 Wochen / Mindestgewicht 1,3 kg



Ein gutes Rezept



Empfehlung zur Zeckenbekämpfung:

Einzeldosis 1 x im Monat über die gesamte Zeckensaison

Empfehlung zur Flohbekämpfung:

Einzeldosis 1 x im Monat über das gesamte Jahr

Empfehlung zur *Sarcoptes*-Milben-Bekämpfung:

Einzeldosis 1 x im Monat, an 2 aufeinanderfolgenden Monaten





Fragen zu Simparica®

1. Gegen welche Parasiten wirkt das Produkt?

Simparica® wirkt nachhaltig gegen Zecken, Flöhe und Räudemilben beim Hund. In Laborstudien wurde auch die Wirkung gegen *Demodex* und *Otodectes* bestätigt.

2. Wie wirkt das Produkt?

Simparica® führt zu einer gesteigerten Nervenstimulation und zum Tod des Parasiten. Das Nervensystem des Hundes wird dagegen nicht beeinträchtigt.

3. Wie verträglich ist das Produkt? Schadet die Substanz meinem Hund?

Simparica® ist für den Hund sehr gut verträglich. In der empfohlenen Dosierung sind in klinischen Studien keine Nebenwirkungen bekannt geworden, die auf Sarolaner zurückgeführt werden konnten.

4. Muss ich die Zecken entfernen oder fallen sie ab?

24 Std. nach Eingabe der Kautablette sind alle Zecken am Hund abgetötet, die anschließend austrocknen und nach 1–3 Tagen von selbst abfallen.

5. Wie muss das Produkt dosiert werden?

Die Dosierung von Simparica® beträgt 2–4 mg/kg Körpergewicht. Es gibt 5 Tablettenstärken für alle Gewichtsklassen von 1,3–40 kg.

6. Wie häufig sollte mein Hund die Kautablette einnehmen?

Zur Zeckenbekämpfung genügt die Eingabe 1 x im Monat in der Zeckensaison. Zur Flohbekämpfung sollte die Kautablette 1 x im Monat über das ganze Jahr verabreicht werden. Zur *Sarcoptes*-Milben-Bekämpfung sollte die Kautablette 1 x im Monat an 2 aufeinanderfolgenden Monaten gegeben werden.

Fragen zu Simparica®



7. Was ist, wenn ich die monatliche Eingabe verpasse?

Simparica® entfaltet über 35 Tage eine zuverlässige Wirkung gegen Zecken und Flöhe, sodass selbst nach Ablauf eines Monats noch ein Spielraum für die Eingabe besteht. Die einfache Dosis dann möglichst zeitnah verabreichen.

8. Welchen Geschmack hat die Kautablette?

In der Simparica®-Kautablette ist auch Schweineleber-Pulver enthalten, wodurch diese von Hunden sehr gerne aufgenommen wird.

9. Darf ich das Produkt bei trächtigen und laktierenden Hunden einsetzen?

Die Unbedenklichkeit des Tierarzneimittels während der Trächtigkeit und Laktation oder bei zur Zucht bestimmten Tieren wurde nicht belegt. Laborstudien bei Ratten und Kaninchen haben keine Hinweise auf eine teratogene Wirkung ergeben. Nur nach entsprechender Nutzen-Risiko-Bewertung durch den behandelnden Tierarzt anzuwenden.

10. Kann ich das Produkt auch einer Katze verabreichen?

Simparica®-Kautabletten sind nur für Hunde zugelassen. Klinische Daten für andere Tierarten liegen nicht vor.



Simparica®

(Sarolaner) Kautabletten



- Verlässliche Wirkung über den vollen Monat
- Breiter Schutz gegen Ektoparasiten (Zecken, Flöhe, *Sarcoptes*-Milben)
- Niedrige Dosierung des Wirkstoffs
- Gute Verträglichkeit
- Zugelassen für Hunde ab 1,3 kg
- Leckere Kautablette – einfach 1 x im Monat
- Keine Nebenwirkungen in der empfohlenen Dosierung bekannt

Simparica® 5 mg Kautabletten für Hunde 1,3–2,5 kg, **Simparica®** 10 mg Kautabletten für Hunde >2,5–5 kg, **Simparica®** 20 mg Kautabletten für Hunde >5–10 kg, **Simparica®** 40 mg Kautabletten für Hunde >10–20 kg, **Simparica®** 80 mg Kautabletten für Hunde >20–40 kg, **WIRKSTOFF UND SONSTIGE BESTANDTEILE:** Jede Kautablette enthält: Wirkstoff: Sarolaner 5/10/20/40/80 mg. Sonstige Bestandteile: Hypromelloseacetat-succinat, mittelfreiließendes Granulat, Lactose-Monohydrat, Natriumstärkeglycolat, Hochdisperses Siliciumdioxid, Magnesiumstearat, Maisstärke, Puderzucker, Glucose-Sirup (81,5% Feststoffe), sprühgetrocknete Schweineleber-Pulver, Würze, pflanzliches Proteinhydrolysat, Gelatine Typ A, Weizenkeime, Calciumhydrogenphosphat wasserfrei. **ANWENDUNGSGEBIETE:** Zur Behandlung von Zeckenbefall (*Dermacentor reticulatus*, *Ixodes hexagonus*, *Ixodes ricinus* und *Rhipicephalus sanguineus*). Das Tierarzneimittel hat eine sofortige und anhaltende Zecken tötende Wirkung für mindestens 5 Wochen. Zur Behandlung von Flohbefall (*Ctenocephalides felis* und *Ctenocephalides canis*). Das Tierarzneimittel hat eine sofortige und anhaltende Floh tötende Wirkung für mindestens 5 Wochen gegen Neubefall. Das Tierarzneimittel kann als Teil der Behandlungsstrategie zur Kontrolle der allergischen Flohdermatitis (FAD) verwendet werden. Zur Behandlung der *Sarcoptes*-Räude (*Sarcoptes scabiei*). Flöhe und Zecken müssen am Wirt anheften und mit der Nahrungsaufnahme beginnen, um dem Wirkstoff ausgesetzt zu werden. **GEGENANZEIGEN:** Nicht anwenden bei bekannter Überempfindlichkeit gegenüber dem Wirkstoff oder einem der sonstigen Bestandteile. **NEBENWIRKUNGEN:** Keine bekannt. **WARTEZEIT:** Nicht zutreffend. Besondere Warnhinweise für jede Zieltierart: Die Parasiten müssen mit der Nahrungsaufnahme beginnen, um in Kontakt mit dem Wirkstoff Sarolaner zu kommen; daher kann die Übertragung von infektiösen parasitären Krankheiten nicht vollständig ausgeschlossen werden. Verschreibungspflichtig. Zulassungsinhaber: Zoetis Belgium SA, Rue Laid Bur-niat 1, 1348 Louvain-la-Neuve, BELGIEN. Örtlicher Vertreter DE: Zoetis Deutschland GmbH, Schellingstraße 1, 10785 Berlin. Örtlicher Vertreter AT: Zoetis Österreich GmbH, Floridsdorfer Hauptstraße 1, A - 1210 Wien.